



Bulletin info prairie n°2 – 27/03/18

Suivi de croissance de l'herbe

## Démarrer la mise à l'herbe dans la plaine

Voici les cumuls de 5 stations météo de la Loire :

Cumul T°C (base 01/02)	Andrézieux (400 m)	Perreux (279 m)	Boën (430 m)	Bard (800m)	Grammond (810 m)
Cumul T°C (base 01/02) au 24/03/18	237	235	231	170	155
Cumul précipitations depuis le 1/2/18	78	121	38	88	99

Un repère pour la mise à l'herbe est de lâcher à 250°C de somme de température base 0-18°C au 1<sup>er</sup> février. Il sera atteint cette semaine.

Si vous n'avez pas de station météorologique proche de votre exploitation, la pleine floraison des forthisias (observer un arbuste qui n'est pas protégé par un bâtiment ou autre) a lieu à ce cumul de température. De plus, nous arrivons fin mars cette semaine. Il est **impératif de commencer le tour de pâture pour avoir terminé le premier tour avant le 15 avril**. Mi-avril, la pousse est toujours soutenue et nous risquons de nous faire dépasser si le premier tour n'est pas terminé à ce moment-là.

A la mise à l'herbe, les animaux trient moins : c'est le moment de faire pâturer les parcelles avec des feuilles sénescents poussées de l'automne dernier (dactyle, féтуque). N'attendez pas. Ce **déprimage** va favoriser la reprise de la pousse et le tallage. On peut aussi mettre à disposition, si l'accès aux parcelles le permet, des parcelles de ray grass dont les feuilles sont touchées par le gel.

Les cumuls de **précipitations** sont très différents sur la Loire : de 39mm à Boën à 121mm à Charlieu. Les prévisions nous annoncent une semaine plus tempérée avec de la pluie. Pour limiter l'impact du pâturage sur les prairies :

- Choisir les parcelles les plus saines.
- Réduire le temps de présence des animaux sur la parcelle. 2 à 3 heures suffisent pour ingérer l'herbe disponible. Ne laisser pas les animaux au froid.
- Préférer un paddock d'un jour à un paddock de 3j. L'impact est moindre comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre.



Paddock pâturé en 3j



Paddock adjacent pâturé en 3 x 1j

Cette mise à l'herbe progressive assurera une transition de trois semaines.

Florence Fargier – Loire Conseil Elevage  
Pierre Vergiat – Chambre d'Agriculture de la Loire