



Bulletin info prairie n°8 – 11/05/18

Suivi de croissance de l'herbe

Début des premières coupes en coteaux ...

Des orages sont annoncés dans les 10 prochains jours. Le manque de pluie sur certains secteurs, commencent à pénaliser les croissances. Après les premières coupes il est important de faire le point sur les parcelles de regains et celle qui permettront d'agrandir le pâturage.

En plaine (400m) : les premières coupes doivent se terminer. Les parcelles destinées aux regains peuvent bénéficier d'un apport de 15 à 20 m³/ha de lisier ou 30 unités d'azote.

En coteaux (600m) : le seuil des 650°C est atteint, les 700°C le seront en fin de semaine. Les premières coupes peuvent débuter.

En montagne (800m) : les animaux doivent être sortis des parcelles de fauches sous peine de pénaliser fortement les rendements en premières coupe. Les fauches précoces sont à prévoir pour la troisième semaine de mai.

La pousse de l'herbe explosive ce début de printemps a occasionné l'apparition de zones de refus. Afin de conserver une herbe de qualité pour les prochains tours de pâturage, vous pouvez profiter que les faucheuses sont attelées pour « nettoyer » les parcelles de pâtures.

Attention aux hauteurs de fauche : les premières observations réalisées ce printemps témoignent de hauteur de fauches trop basses. Les prairies fauchées à moins de 7 cm de hauteur, soit des parcelles de couleur « blanche », vont mettre plus longtemps pour redémarrer. Prenez le temps de régler vos faucheuses...

Florence Fargier – Loire Conseil Elevage

Pierre Vergiat – Chambre d'Agriculture de la Loire

xx

28/04/18	2018	Rappel 2017	Normales
St Etienne (400m)	658	729	663
Boën (430m)	660	749	667
Grammond (742m)	542	637	551
Chalmazel (990m)	415	496	