




# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°7 – semaine 16 – lundi 15 avril 2019

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 15/04/19



**Boën - 430m**  
Somme de t° : 575°C à partir du 01 février

**Crèmeaux - 700m**  
Pousse d'herbe 30-50 kg MS/ha/jour

**Bard - 810m**  
Somme de t° : 466°C à partir du 01 février

**Andrézieux Bouthéon - 400m**  
Somme de t° : 530°C à partir du 01 février

**Usson en Forez - 900m**  
Mise à l'herbe le 15/04  
Pousse d'herbe 30-60 kg MS/ha/jour (parcelles bien exposées) et 5-20 kg MS/ha/jour pour les autres

**St Maurice en Gourgais - 600m**  
1<sup>er</sup> tour en cours avec une pousse ralentie : environ 15 kg MS/ha/jr

**Charlieu - 279m**  
Somme de t° : 529°C à partir du 01 février

**Violay - 830m**  
Somme de t° : 492°C à partir du 01 février

**Cottance - 500m**  
Pousse d'herbe 30-50 kg MS/ha/jour  
Récolte des RGI dès que possible

**Yzeron - 700m**  
Somme de t° : 523°C à partir du 01 février

**Grammond - 804m**  
Somme de t° : 497°C à partir du 01 février

**Pélussin - 400m**  
Somme de t° : 616°C à partir du 01 février

### Point météo :

- sommes de températures : en raison des gelées matinales l'avance par rapport « aux normales » s'est fortement ralenti environ 4 jours.
- pluviométrie : le déficit depuis le 01/01 est toujours aussi important par rapport « aux normales » avec 40 mm par rapport à 2018 et 26 mm par rapport aux « normales ».

### Que faire cette semaine :

- Les croissances d'herbe sont très hétérogènes selon les zones du département et même à l'échelle de chaque exploitations. Les prairies permettent actuellement de couvrir les besoins de 1 à 3 vaches/ha en ration 100% herbe.
- En plaine (400m) : les ensilages de RGI doivent se terminer dès que possible.
- Zone de coteaux (600m) : les 500°C devraient être atteints cette semaine, les ensilages de RGI peuvent démarrés.
- Montagne (>800m) : poursuite des mises à l'herbe

### Zoom technique : le sursemis

- semis de prairie ou réfection : c'est le moment
- rajouter 40 à 50 kg d'avoine pour garnir rapidement le sol et assurer une première coupe et éviter trop d'évaporation du sol

### Les Conservateurs d'herbe

Pour limiter le développement des butyriques dans les ensilages, on peut envisager d'ajouter un conservateur pour favoriser la baisse du pH : 2 solutions, acide formique

### Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

**Sursemis et apport d'azote sur fauche tardive** : à partir de 350°C

**Fin de déprimage et fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage** à 500° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février

**Ensilage** à 700° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février (550°C pour les RGI)

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>  
**Contact** : Stéphane LAURENT  
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr  
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>  
**Contact** : Pierre VERGIAT  
 pierre.vergiat@loire.chambagri.fr  
 Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

