



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°11 – semaine 20 – lundi 13 mai 2019

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 15/04/19

Boën - 430m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Crémeaux - 700m

Pousse d'herbe 40-45 kg MS/ha/jour
Ensilage prévu

Bard - 810m

Somme de t° : 716°C à partir du 01 février

Andrézieux Bouthéon - 400m

Somme de t° : 862°C à partir du 01 février

Usson en Forez - 900m

Pousse d'herbe 40-50 kg MS/ha/jour
Débrayage de certaines parcelles pour le foin

St Maurice en Gorgois - 600m

Pousse d'herbe 34 kg MS/ha/jour
2 vaches/ha en ration 100% pâture

Charlieu - 279m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Violay - 830m

Somme de t° : 749°C à partir du 01 février

Cottance - 500m

Pousse d'herbe 30-50 kg MS/ha/jour sur PN et
entre 80 et 100 kg MS/ha/jour pour les RGI

Yzeron - 700m

Somme de t° : 789°C à partir du 01 février

Grammond - 804m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Pélussin - 400m

Somme de t° : 948°C à partir du 01 février

Point météo :

- sommes de températures : l'avance réalisée sur les mois de mars et d'avril s'est peu à peu comblé avec les conditions fraîches de début Mai. Les gelées matinales persistent à certains endroits.

- pluviométrie : en raison des pluies importantes des dernières semaines, l'année 2019 se rapproche des « normales » avec un déficit de 18 mm à la station d'Andrézieux Bouthéon.

Que faire cette semaine :

- Les croissances d'herbe sont toujours hétérogènes selon les zones du département. Malgré la pluie de ces dernières semaines, le froid matinal freine toujours la croissance.

- En plaine (400m) : début des 2^{ème} coupe notamment pour les RGI ensilés début avril.

- Zone de coteaux (600m) : le seuil des 700°C est dépassé, les 1^{ères} coupes peuvent être réalisées. Les méteils prévus en fourrages sont à faucher dès l'apparition des fleurs du pois.

- Montagne (>800m) : les 1^{ère} coupe sont à prévoir.

Essai méteils – récoltes précoces – St Cyr les Vignes :

Les méteils prévus en ensilage avec comme objectif la valeur alimentaire doivent se récolter au stade début floraison du pois.

Attention aux hauteurs de fauche : les premières observations réalisées ce printemps témoignent de hauteur de fauches trop basses. Les prairies fauchées à moins de 7 cm de hauteur, soit des parcelles de couleur « blanche », vont mettre plus longtemps pour redémarrer. Prenez le temps de régler vos faucheuses...

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Ensilage / enrubannage / foin ventilé : 650-700° base 0-18 au 1^{er} février (550°C pour les RGI)

Foin précoce : 1 000°C

Foin tardif : 1 200°C

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE

