



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°16 – semaine 25 – lundi 17 juin 2019

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 15/06/19

### Boën - 430m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

### Crémeaux - 700m

Pousse d'herbe assez active de 50 à 60 kg MS/ha/jour ; Foins à réaliser 40 mm la semaine passée

### Bard - 810m

Somme de t° : 1159°C à partir du 01

### Andrézieux Bouthéon - 400m


Somme de t° : °C à partir du 01 février

### Usson en Forez - 900m

Milieu de 3<sup>ème</sup> tour de pâturage ; 67 mm la semaine dernière ; Les foins vont pouvoir démarrer

### St Maurice en Gourgois - 600m

Poursuite du pâturage avec gestion des refus ; foins à réaliser



### Charlieu - 279m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

### Violay - 830m

Somme de t° : 1176°C à partir du 01 février

### Cottance - 500m

Pousse d'herbe limitée à 20 kg MS/ha/jour par manque d'eau ; foins en cours ; environ 55 mm d'eau ; 3<sup>ème</sup> coupe longue à redémarrer

### Yzeron - 700m

Somme de t° : 1233°C à partir du 01 février

### Grammond - 804m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

### Pélussin - 400m

Somme de t° : 1431°C à partir du 01 février

### Point météo :

- sommes de températures : conditions météo normales plus favorable à la pousse et dans la moyenne des normales saisonnières

- pluviométrie : les pluies récentes ont relancées la pousse de l'herbe et devrait permettre de pâturer au moins jusqu'à fin juin

- la semaine est annoncée chaude avec des orages sur la fin

### Que faire cette semaine :

- En plaine (400m) : fin de récolte des foins et début des 3<sup>ème</sup> coupe sur ray-grass

- Zone de coteaux (600m) : la période pour le foin est idéale pour les fauches tardives ou déprimées ainsi que les 2<sup>ème</sup> coupes

- Montagne (>800m) : début des foins et gestions des refus

### Alimentation estivale :

Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la saison de pâturage, il est possible d'envisager le semis de dérobée sur des parcelles libérées derrière une céréale :

Avant le 10 juillet :

Sorgho fourrager : 25 kg /ha

Moha + trèfle d'alexandrie : 18 à 20 kg + 3 à 5 kg /ha

Avant fin août :

RGI alternatif diploïde : 22 à 25 kg/ha

Colza fourrager : 8 à 10 kg/ha

Semer le plus rapidement possible après la récolte pour profiter de l'humidité résiduelle et peu profond ( 1 à 2 cm ) pour une levée rapide

Fertiliser pour favoriser la pousse ( 40 à 60 u d'azote )

### Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

**Ensilage / enrubannage / foin ventilé :** 650-700° base 0-18 au 1<sup>er</sup> février (550°C pour les RGI)

**Foin précoce :** 1 000°C

**Foin tardif :** 1 200°C

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT  
slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT  
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr  
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE  
CONSEIL ÉLEVAGE

