



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°17 – semaine 26 – lundi 24 juin 2019

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 24/06/19

Boën - 430m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Crémeaux - 700m

Pousse d'herbe 30-40 kg MS/ha/jour
Tout a été fauché – début du pâturage des repousses

Bard - 810m

Somme de t° : 1267°C à partir du 01 février

Andrézieux Bouthéon - 400m


Somme de t° : °C à partir du 01 février

Usson en Forez - 900m

Pousse soutenue à 60 kg MS/ha/jour
Plein pâturage

St Maurice en Gourgais - 600m

Pas de croissance d'herbe cette semaine
en raison de la grêle du 15/06 : commune touchée à 95%



Charlieu - 279m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Violay - 830m

Somme de t° : 1283°C à partir du 01 février

Cottance - 500m

Pousse d'herbe limitée à 25 kg MS/ha/jour
Toutes les parcelles ont été fauchées

Yzeron - 700m

Somme de t° : 1341°C à partir du 01 février

Grammond - 804m

Somme de t° : °C à partir du 01 février

Pélussin - 400m

Somme de t° : 1549°C à partir du 01 février

Point météo :

- température : le seuil des 1 200°C est atteint sur tous les secteurs en dessous de 1 000m, les récoltes en foin tardif, avec comme objectif la quantité, doivent être réalisés.
- pluviométrie : le cumul sur le mois de juin à Andrézieux est conforme aux « normales ». Depuis le 01/01, le déficit est toujours de 60 mm.

Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs

- Croissance de l'herbe : L'épisode de fortes chaleurs de cette semaine va entraîner un fort ralentissement de la pousse de l'herbe.
- En plaine (400m) : poursuite des foins et agrandissement des parcelles de pâture
- Zone de coteaux (600m) : poursuite des foins et agrandissement des parcelles de pâture
- Montagne (>800m) : début des foins et gestions des refus

Autres infos :

- Début des moissons en plaine

Abreuvement des troupeaux :

Les besoins journaliers sont pour une vache laitière en lactation de l'ordre de 120-150 litres et pour une vache tarie ou une génisse 60-80 litres. Une attention particulière doit être portée aux aménagements des points d'eau afin d'éviter divers problèmes pathologiques liées aux zones piétinées et boueuses. Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la zone de pâturage doit être éloignée au maximum de 300 à 400 m de la zone d'abreuvement. Au-delà de cette distance, les performances zootechniques s'en trouvent diminuer.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Ensilage / enrubannage / foin ventilé : 650-700° base 0-18 au 1^{er} février (550°C pour les RGI)

Foin précoce : 1 000°C

Foin tardif : 1 200°C

Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouvez nous sur le site <http://www.loire.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE

