



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°4 – semaine 10 – lundi 2 MARS 2020

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 02/03/20



Arthun - 350m

Somme de t° : 239°C à partir du 01 février

Ressins – 330 m

20 kg ms d'herbe /ha/jour

Roanne – 336m

Somme de t° : 248°C à partir du 01 février

Violay – 830m

Somme de t° : 185°C à partir du 01 février

Panissières – 600 m

Bard – 810m

Somme de t° : 191 °C à partir du 01 février

St Etienne Andrézieux – 400m

Somme de t° : 244°C à partir du 01 février

St Maurice en Gourgis – 600m

Veauchette – 360m

Somme de t° : 256°C à partir du 01 février

St Bonnet le Château - 870m

Somme de t° : 183 °C à partir du 01 février

Pélussin – 400m

Somme de t° : 240°C à partir du 01 février

Point météo :

- sommes de températures : l'avance se maintient à plus de 15 jours par rapport à la « normale » et plus de 10 jours par rapport à 2019,
- pluviométrie : la répartition est très inégale sur le département. Sur tout le mois de février il n'est tombé que 9 mm à Andrézieux.
- prévision pour les 10 prochains jours : conditions météo assez perturbées pour cette première décade avec des températures proches des « normales » voir légèrement inférieures et une succession de « petites » pluies.

Que faire cette semaine :

- Zone de plaine (400-600m) : le repère 250°C base 01/02 est atteint cette semaine, les premiers animaux pourraient débuter le déprimage. La pousse de l'herbe a débutée plus forte que la normale : 10 kg ms/ha/jr cette année sur fin février contre 5 kg habituellement
- Zone de coteaux (600-800m) : fin des premiers apports sur fauche précoce et fin des éventuels hersages de prairies.
- Zone de montagne (> 800m) : encore une douzaine de jours pour les premiers apports sur fauche précoce.

Zoom technique : le déprimage

- Les premières fleurs des forsythias sont sorties. Les premiers animaux peuvent débuter le déprimage en zone de plaine si les conditions de portances sont réunies. Le talon de la botte ne soit pas s'enfoncer à plus de 4 cm de profondeur.
- avant d'envisager les premières sorties d'animaux, il convient de vérifier la quantité d'herbe dans les paddocks. Une hauteur moyenne de 6 cm, au-dessous du talon de la botte, est requise pour le début du déprimage.

Sommes de températures : comment les utiliser ?

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la prairie. Elles permettent d'anticiper les interventions.

Apports azotés :

Entre 200° base 0-18° au 1^{er} janvier et 200° base 0-18° au 1^{er} février

Mise à l'herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1^{er} février

Un correctif de + ou - 0.6 °C par jour peut-être appliqué par 100 m d'altitude de différence par rapport à la station la plus proche

L'exposition des parcelles doit aussi être prise en compte pour commencer par celle se réchauffant plus vite

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE