



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°13 – semaine 19 – lundi 4 MAI 2020

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 03/05/20

### Roanne – 336m

Somme de t° : 888°C +92°C

### Arthun – 350m

Somme de t° : 863°C +88°C

### Bard – 810m

Somme de t° : 760°C +75°C

### Savigneux – 380m

Pousse : 88 kg ms d'herbe /ha/jour

### St Bonnet le Chateau – 870m

Somme de t° : 741°C +77°C

### St Maurice en Gourgis – 600m

Hauteur moyenne : 8.1 cm –  
croissance à 41 kg MS/ha/jour  
Pâture jour et nuit

### Ressins – 330 m

Pousse : 102 kg ms d'herbe /ha/jour

### Parigny – 400 m

Pousse : 14 kg ms d'herbe /ha/jour

### Violay – 830m

Somme de t° : 789°C +74°C

### Panissières – 600 m

Pousse : 72 kg ms d'herbe /ha/jour

### St Etienne Andrézieux – 400m

Somme de t° : 908°C +96°C

### Chazelles sur Lyon – 550 m

Pousse : 62 kg ms /ha/jour

### Veauchette – 360m

Somme de t° : 904°C +93°C

### Pélussin – 400m

Somme de t° : 949°C +91°C

### Point météo :

La semaine dernière il est tombé entre 30 et 45 mm (localement 60-70mm). Cette semaine le beau temps sera de retour avec une hausse des températures (moyenne de 20-25°C). Des risques d'orages sont prévus mardi et en fin de semaine.

Le mois d'avril aura été le troisième mois consécutif avec une température moyenne supérieure de 3°C par rapport aux normales.

### Croissance de l'herbe :

- Les pluies et la chaleur de cette semaine seront très favorables à la croissance de l'herbe.

Une croissance comprise entre 40 et 80 kg MS/ha/jour permet de nourrir entre 3 et 5 vaches / ha avec 16 kg MS ingérés à la pâture. La complémentation à la pâture doit être diminuée afin d'avoir une utilisation optimale des pâtures.

### Que faire cette semaine :

Les fauches vont être délicates cette semaine en raison des cumuls de la semaine dernière et des prévisions d'orage pour la fin de semaine.

- Zone de plaine (400-600m) : atteinte des 900°C, les premiers foin pourraient se réaliser.

- Zone de coteaux (600-800m) : poursuite des premières coupes dès que possible.

- Zone de montagne (> 800m) : atteinte des 700°C ce début de semaine.

### Zoom technique : gestion du pic d'herbe

Les pluies arrivées, l'explosion de la pousse de l'herbe est engagée ! Suivre de près ses parcelles est indispensable pour éviter le gaspillage, car on observe des croissances de 60 à plus de 100 kg de ms/ha/jour. Avec la montée à l'épi des graminées, il ne faut pas hésiter à faucher une ou deux parcelles pour les garder dans le circuit de pâture.

### La récolte des méteils ?

Les mélanges céréales protéagineux ont deux finalités : recherche de la qualité ou de la quantité. Lorsque l'on souhaite récolter un fourrage de qualité, il faut le faucher au stade montaison-début d'épiaison de la céréale et début floraison des protéagineux. Ce stade précoce permet aussi d'envisager un panel plus large de cultures d'été (maïs, sorgho...). Les mélanges riches en protéagineux ont une teneur en matière sèche faible de l'ordre de 14%. En ensilage il faut viser une récolte à 25%. Il faut donc souvent 3 jours entre la fauche et l'ensilage avec du vent si possible. La hauteur de fauche devra être de 8 à 10 cm et les andains le plus large possible afin de faire sécher le fourrage.

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

