



A retenir cette semaine :

Les premières coupes ont pu se terminer dans les parcelles peu portantes, alors que les foins débutent difficilement par manque de créneaux sécurisés au niveau météo !

Certaines parcelles sont néanmoins récoltées pour la troisième fois ce printemps, avec des fourrages au bon stade ! Le taux de matière sèche est plus limité, mais la valeur des ensilages est préservée (cf photo ci-contre, RGI le 06/06, après 2 récoltes début avril et début mai)



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Croissance (kg ms/ha/jr)	
St Héand, 575m	9,3	38,9	7 ^{ème} cycle de pâturage
Soleymieux, 630m	7,9	18,4	6 ^{ème} cycle + fauche 2 ^{ème} débrayage
Périgneux, 680m	8,7	48,6	6 ^{ème} cycle + fauche 2 ^{ème} débrayage
Essertines-en-Chatelneuf, 800m	9,2	27,8	6 ^{ème} cycle, pâture derrière fauche
St Bonnet le Courreau, 1070m	8,3	46,6	6 ^{ème} cycle + fauche 2 ^{ème} débrayage
Champoly, 660m	8,8	52,3	6 ^{ème} cycle + fauche refus
Violay, 850 m	8,1	49	Pâturage prairie derrière ensilage
St Marcel de Félines, 490 m	8,3	39,4	4 ^{ème} cycle, fauche en foin des parcelles débrayées
Violay, 700 m	8,2	41,7	4 ^{ème} cycle, pâture derrière 1 ^{er} ensilage
Violay, 720 m	10	66,7	4 ^{ème} cycle, 2 ^{ème} coupe ensilée



Etagement des récoltes



Rédaction de cette semaine :

Stephane Laurent, Loire
Conseil Elevage, en
collaboration avec la
Chambre d'agriculture 42

Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. juin
Bard	1016	32
Noirétable	1246	50
St Sauveur en Rue	1274	37
Violay	1262	22

Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. juin
Chazelles sur Lyon	1364	50
Fourneaux	1437	54
La Valla en Gier	1411	96
Panissières	1373	16
St Georges en Couzan	1321	21

Stations météo	Somme T°C depuis 1/02	Cumul pluvio. juin
Arthun	1432	8
Balbigny	1502	15
Nandax	1487	30
Pélussin	1596	28
Savigneux	1440	31
Veauchette	1491	28

Source infoclimat / météo France au 15/06/2024



Gestion des refus



La gestion des refus sur les pâtures peut être réalisée grâce au topping : la météo est maintenant plus favorable à cette pratique qui consiste à faucher l'herbe disponible dans la parcelle avant l'entrée des animaux ! Cela favorise une meilleure consommation des plantes avec une diminution de l'amertume due à la fauche



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT
SLaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



Pâturage des animaux

En fin de printemps, la qualité de l'herbe évolue rapidement, notamment sur les prairies naturelles ! Il est difficile de conserver une bonne appétence et valeur sans intervention mécanique. L'ajout de prairies temporaires, initialement récoltées en ensilage, permet d'avoir de l'herbe de qualité sur cette période !

Photo :
Prairie multi-espèce de 2 ans pâturée 15 jours avant et récoltée en ensilage 35 jours plus tôt à 830 m d'altitude



Méteil en agriculture biologique : vesce + pois + triticale à 1000 m d'altitude
Récolté semaine dernière en enrubannage



Retrouvez nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Augustin Gravier
augustin.gravier@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture de la Loire – 42270 St Priest En Jarez